

Nueva Información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre los eventos tromboembólicos con la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca



En base a los datos estudiados, **existe una posibilidad muy baja de que se formen coágulos** en lugares poco frecuentes como pueden ser algunas venas cerebrales o del abdomen.



Los casos notificados hasta ahora son muy escasos respecto al número de personas vacunadas y se han presentado en personas que habían recibido esta vacuna recientemente (en los 14 días anteriores), mayoritariamente en **mujeres de menos de 60 años**.



Los **síntomas sobre los que debe estar alerta** y buscar atención médica si se presentan, incluyen:

- **Dificultad para respirar.**
- **Dolor en el pecho.**
- **Hinchazón o dolor frialdad en una pierna.**
- **Dolor abdominal persistente.**
- **Dolor de cabeza intenso y persistente o que empeora más de 3 días después de la vacunación.**
- **Visión borrosa o doble.**
- **Múltiples hematomas pequeños, manchas rojizas o violáceas, en la piel.**

Información de la Agencia Europea del Medicamento sobre los eventos tromboembólicos con la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca

- ✓ La vacuna de AstraZeneca **no está asociada con un mayor riesgo** global de trastornos de la coagulación sanguínea.
- ✓ Se han notificado **casos excepcionales de trombosis asociados a niveles bajos de plaquetas** en la sangre, incluidos casos raros de coágulos en los vasos cerebrales.
- ✓ **La eficacia probada de la vacuna** para prevenir la hospitalización y la muerte por COVID-19 **supera la probabilidad extremadamente pequeña** de desarrollar estos problemas de coagulación.
- ✓ **No hay evidencia de un problema relacionado con lotes específicos** de la vacuna o con sitios de fabricación.

➔ Para mayor tranquilidad, **vigile estos síntomas** después de recibir la vacuna:

- Dificultad para respirar.
- Dolor en el pecho o en la zona del estómago.
- Hinchazón o frialdad en un brazo o una pierna.
- Dolor de cabeza intenso o visión borrosa.
- Sangrado persistente.
- Pequeños hematomas, manchas rojizas o violáceas, o ampollas de sangre debajo de la piel.

En caso de presentarse, **busque asistencia médica inmediata y mencione su reciente vacunación.**